Observation inédite de nidification en falaise meuble et coprophagie parentale chez le Pic de Levaillant (*Picus vaillantii*) au Maroc

Farid ZINBI [1] & Taoufik MAZOUZI [2]

[1] Poste Centrale, BP 254, Boulevard Hassan 2 — 63602 Saïdia (Maroc)
[2] Rue Tadla N°14, Hay Moulouya – Berkane (Maroc)

Citation : Zinbi, F. & Mazouzi, T. 2026. Observation inédite de nidification en falaise et coprophagie parentale chez le Pic de Levaillant (*Picus vaillantii*) au Maroc. *Éléments d'Ornithologie Marocaine* eom26102, 3 pp.

Observations

Le Pic de Levaillant (*Picus vaillantii*) est une espèce quasi-endémique d'Afrique du Nord, généralement inféodée aux milieux forestiers et arborés (forêts de cèdres, de chênes et maquis boisés) où il creuse ses cavités de nidification dans les troncs et les grosses branches (Cramp 1985 ; Del Hoyo *et al.* 2002). Nous rapportons ici une observation doublement inédite pour cette espèce : un cas de nidification en falaise terreuse meuble associé à un comportement d'assainissement du nid par coprophagie.

En avril 2026, une cavité de nidification occupée par un couple de Pics de Levaillant a été découverte dans la région de Saïdia (Nord-Est du Maroc), à 3,5 kilomètres de la côte méditerranéenne. Contrairement à l'écologie habituelle de l'espèce, le nid était creusé dans un talus terreux vertical meuble, au fond d'une vallée totalement dépourvue d'arbres à proximité immédiate — dans les petites forêts proches, la plupart des arbres, de jeunes eucalyptus, étaient morts ou secs.

La cavité se situait à 7 mètres de hauteur par rapport au fond de la vallée et à un mètre environ sous le rebord supérieur du plateau.

Afin de documenter l'événement sans causer de dérangement, un piège photographique et un suivi vidéo à distance ont été mis en place. La couvée initiale comptait cinq oisillons (dont un a malheureusement chuté hors de la cavité au cours du suivi). Les enregistrements continus ont permis de suivre la séquence complète de nourrissage et d'entretien du nid par les deux parents. Outre les va-et-vient réguliers pour l'apport de proies, un comportement remarquable a été documenté à plusieurs reprises : les adultes consommaient directement les sacs fécaux émis par les oisillons au lieu de les transporter à l'extérieur.

La nidification cavicole en substrat terreux est bien connue chez d'autres familles (Meropidae, Alcedinidae), mais demeure extrêmement rare chez les Picidae holarctiques. Des cas exceptionnels de creusement dans des berges ou talus ont déjà été rapportés chez d'autres espèces des genres *Picus* ou *Colaptes* en l'absence d'arbres adéquats. Cette flexibilité comportementale démontre une adaptabilité écologique remarquable du Pic de Levaillant face aux contraintes de son environnement.

Par ailleurs, la coprophagie parentale des sacs fécaux chez des poussins âgés — comportement non documenté jusqu'ici chez *Picus vaillantii* — pourrait répondre à un double enjeu : une optimisation énergétique et nutritionnelle pour les adultes durant la phase critique de l'élevage, couplée au maintien de la propreté sanitaire de la cavité.







Pic de Levaillant *Picus vaillantii* au nid dans une berge. 28 avril 2026



Jeunes Pics de Levaillant *Picus vaillantii* au nid dans une berge. 29 avril 2026.

Bibliographie

Cramp, S. 1985. *The Birds of the Western Palearctic*. Oxford University Press.

Del Hoyo, J. ; Elliott, A. & Sargatal, J. 2002. *Handbook of the Birds of the World*. Lynx Edicions.